КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН

03.02.2020

Заболевание десен



Кровоточивость дёсен не является самостоятельным заболеванием полости рта – это тревожный звоночек о наличии воспалительных процессов. Также кровоточивость может свидетельствовать о системных заболеваниях организма или патологии десны. Проявляется обычно при механическом раздражении зубной щеткой.

Общими причинами кровоточивости дёсен могут быть: недостаток витамина С, приводящей к нарушению свертываемости крови (в литературе описаны как случаи цинги); ВИЧ-инфекция; эндокринные заболевания; изменения гормонального статуса.

При местных патологиях полости рта также можно наблюдать кровоточивость дёсен. Самыми распространенными причинами являются: гингивит, пародонтит, пародонтоз.

Гингивит – это воспаление дёсен. Этиологическим фактором служит скопление и отвердевание налёта, размножение патогенных бактерии. Гингивит - это неразрушающий тип заболеваний пародонта, но без лечения гингивит может перейти в периодонтит, более серьёзное заболевание, которое может в конечном итоге привести к потере зубов. Признаком гингивита являются красные и отечные дёсны, которые легко кровоточат при надавливании.

Пародонтит относится к запущенной стадии гингивита. Если не предпринять соответствующих мер, то воспаление может затронуть ткани пародонта и нарушить функцию тканей. При пародонтите ткань десны отходит от зубов, создавая карманы, в которых скапливаются остатки еды, инфекция. Заболевание часто сопровождается галитозом, покраснением слизистых оболочек. Воспаление затрагивает капилляры, приводит к усилению их проницаемости, отеку, кровоточивости.

Пародонтоз – это поражение околозубной ткани. Его часто путают с пародонтитом. Однако пародонтоз не носит воспалительного характера, это дистрофическое заболевание пародонта. С течением времени пародонтальные ткани рассасываются, зубы становятся шаткими. Заболевание не является осложнением пародонтита. Если на начальном этапе воспаление и не наблюдается, в дальнейшем возможно его развитие, особенно при ненадлежащем несоблюдении гигиены полости рта. Повышенная кровоточивость при пародонтозе не характерна. Наоборот, дёсны приобретают белёсый вид, выглядят безжизненными – это основное различие между пародонтозом и пародонтитом.

Чтобы избавиться от кровоточивости дёсен, в первую очередь необходимо провести предварительную диагностику и лечение основного заболевания, проявлением которого является появление крови.

Терапия начинается с профессиональной чистки зубов с целью удаления зубных отложений.

Для лечения гингивита применяют промывание полости рта антисептическими растворами. При некоторых формах заболевания возможно иссечение разросшейся ткани с последующей обработкой.

При пародонтите лечение включает в себя промывание десневых карманов врачом-стоматологом. Последующее лечение можно проводить в домашних условиях применяя полоскания и аппликации по назначению врача.

На фармацевтическом рынке существует достаточно средств, которые позволяют снизить кровоточивость дёсен, уменьшить их отёчность. Необходим комплексный подход, т.е. применение медикаментов и народных средств. Мы рекомендуем Сандрин – высококонцентрированный экстракт уникального сорта Скумпии из Болгарии, с мгновенным вяжущим (дубильным) эффектом, а также выраженным противовоспалительным и антисептическим действием. При кровоточивости и воспалительных заболеваниях десен, для гигиены полости, для дезинфекции полости рта в стоматологическом кабинете и домашних условиях.